

PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS - 2022**MATEMÁTICA****Versão B**

Alínea c) do n.º 1 do artigo 13.º-C do Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 11/2020, de 2 de abril.

Duração total da Prova: 120 minutos (Português + Matemática).

Tolerância: 30 minutos

6 Páginas

Para cada resposta, identifique o item a que corresponde.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

É permitido o uso de calculadora científica.

Não é permitido o uso de corretor.

Risque o que pretende que não seja classificado.

A cotação de cada item é de 5 pontos.

O enunciado da prova inclui um formulário.

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva, na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Utilize folhas diferentes para responder à parte geral de português e à parte específica de matemática.

Formulário

Probabilidades

X é uma variável aleatória discreta, de valores x_i com probabilidades p_i , $1 \leq i \leq n$

- Média de X
 $\mu = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$
- Desvio padrão de X
 $\sigma = \sqrt{p_1(x_1 - \mu)^2 + p_2(x_2 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2}$

Probabilidade condicionada de A sabendo que ocorreu B

- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Estatística

Sendo x_i valores observados e dimensão da amostra N

- Média
 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$
- Variância
 $s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_N - \bar{x})^2}{N - 1}$
- Desvio padrão
 $s = \sqrt{s^2}$

Derivadas

- $tmv_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$
- $(u + v)' = u' + v'$
- $(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$
- $(u^n)' = n \times u^{n-1} \times u' \quad (n \in \mathbb{R})$
- $(\sin u)' = u' \times \cos u$
- $(\cos u)' = -u' \times \sin u$
- $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$
- $(e^u)' = u' \times e^u$
- $(a^u)' = u' \times a^u \times \ln a \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
- $(\log_a u)' = \frac{u'}{u \times \ln a} \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\})$

Modelos de funções de crescimento

Um modelo de crescimento exponencial é definido por uma função do tipo

- $f(x) = a \times b^x, b > 1$

Um modelo de decrescimento exponencial é definido por uma função do tipo

- $f(x) = a \times b^x, 0 < b < 1$

O modelo logístico é uma função do tipo

- $f(x) = \frac{c}{1+a \times e^{-bx}}, a, b, c \in \mathbb{R}^+$

Regras operatórias das potências e dos logaritmos

Sejam $a \neq 0$ e $b \neq 0$:

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- $a^n \times b^n = (a \times b)^n$
- $a^n : a^m = a^{n-m}$
- $a^n : b^n = \left(\frac{a}{b}\right)^n$
- $(a^n)^m = a^{n \times m}$
- $a^0 = 1$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a \in \mathbb{R}^+, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$

Sejam $p \in \mathbb{R}, x, y \in \mathbb{R}^+$ e $a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$:

- $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$
- $\log_a (x \times y) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a x^p = p \times \log_a x$
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$


Trigonometria

- Fórmula fundamental da trigonometria: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x}$
- $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
- $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + 2k\pi \vee x = \pi - \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow x = \pm \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- $\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Álgebra

- $ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, a \neq 0$

1. A *Ruta del Cares* é um famoso percurso pedestre localizado em Espanha, nas Astúrias, e tem uma extensão aproximada de 12 quilómetros. Considera a função f representada graficamente, em que $f(x)$ corresponde à altitude, em metros, e x à distância percorrida, em quilómetros, ao longo do percurso.



1.1. No contexto da situação, o domínio da função f pode ser:

- (A) $[275, 570]$ (B) $\{0, 12\}$ (C) $[0, 12]$ (D) $[0, +\infty[$

1.2. Podemos afirmar que:

- (A) A equação $f(x) = 500$ tem uma única solução. (B) O conjunto solução da inequação $f(x) \geq 500$ é $\{2, 3\}$
(C) A função f tem máximo e mínimo absolutos. (D) A função f é crescente no seu domínio.

1.3. Um dos ramos da função f pode ter como expressão analítica:

- (A) $y = \frac{80}{7}x + \frac{2540}{7}$ (B) $y = \frac{80}{7}x$ (C) $y = 150x$ (D) $y = \frac{160}{3}x + \frac{2060}{3}$

2. A figura representa um portão de uma garagem cuja forma é a de um retângulo com uma parte em cima limitada por um arco de parábola, em que foi instalado um referencial cartesiano. A distância ao solo, em metros, de cada um dos pontos do arco do portão é dado pela função h , definida pela expressão (com x em metros):

$$h(x) = -0,4x^2 + x + 3$$

2.1. A altura do portão, em metros, no sítio onde estão as dobradiças, isto é, no local onde está colocado o eixo Oy é:


- (A) 3 (B) 3,625 (C) 0 (D) $h(2)$

2.2. A altura máxima do portão, em metros, é:

- (A) 1,25 (B) 3 (C) $h(2,5)$ (D) $h(1,25)$

2.3. Uma carrinha, com a forma de um paralelepípedo, pretende entrar no portão. Quais as dimensões possíveis da carrinha?

- (A) 2 metros de largura e 3,2 metros de altura (B) 2 metros de largura e 3,3 metros de altura
(C) 2,1 metros de largura e 3,19 metros de altura (D) 2,1 metros de largura e 3,2 metros de altura



3. O valor de $\log_3 27 - \log_3 3 - 3$ é:
- (A) 3 (B) 21 (C) 27 (D) -1
4. Sabendo que $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, então tem-se como valores possíveis para o seno e o cosseno:
- (A) $\sin \alpha = \frac{3}{2}$
e $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- (B) $\sin \alpha = \sqrt{3}$
e $\cos \alpha = 3$
- (C) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
e $\cos \alpha = \frac{1}{2}$
- (D) $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$
e $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
5. Relativamente à função $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x}$, podemos afirmar que:
- (A) Não tem zeros (B) Tem um zero (C) É não monótona (D) É crescente
6. Numa determinada comunidade o crescimento populacional é dado por uma função logística P que relaciona o tempo t , em meses, que decorrem a partir do instante inicial, com o número de indivíduos. A função P é definida por $P(t) = \frac{10000}{1+10e^{-0,3t}}$. Sabe-se que, com o decorrer do tempo, o número de indivíduos tende a estabilizar em torno de a . O valor de a é:
- (A) 40000 (B) 30000 (C) 20000 (D) 10000
7. A partir de uma folha retangular, cujos lados medem 1 metro e 2 metros, podemos construir uma caixa em forma de paralelepípedo cortando em cada um dos cantos um quadrado de lado x (como se mostra na figura), e dobrando, em seguida, ao longo dos segmentos representados com traço interrompido.



- 7.1. A expressão que permite calcular o volume da caixa, em função de x , pode ser dada por:
- (A) $(2 - 2x) \cdot (1 - 2x)$ (B) $(2 - 2x) \cdot (1 - 2x) \cdot x$
- (C) $(2 - 2x) \cdot (1 - x) \cdot x$ (D) $(2 - 2x) \cdot (3 - 2x)$
- 7.2. O valor exato de x para o qual o volume da caixa que se obtém é máximo é:
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}$ (D) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}$
8. A procura de cafés, numa determinada pastelaria, depende do preço de cada café x (em cêntimos), e pode ser representada pela função procura: $P(x) = 100 - (x - 90)^2$. A taxa média de variação da procura de cafés resultante da subida de preço de 87 para 97 cêntimos é:
- (A) -4 (B) 2 (C) -2 (D) 4
9. O declive da reta tangente ao gráfico da função $f(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$, no ponto de abscissa $x = 10$, é:
- (A) 200 (B) -200 (C) -20 (D) 20

REDE NORTE

10. Foram registados os pesos, em kg, de 14 estudantes de uma turma. Os valores em kg obtidos e ordenados por ordem crescente foram:

56,0	57,1	59,6	60,4	60,5	60,9	61,2
62,2	63,8	64,2	64,5	64,6	65,1	65,2

- 10.1. Qual o valor do 3º quartil?
 (A) 64,5 kg (B) 62,2 kg (C) 61,2 kg (D) 60,4 kg
- 10.2. Qual o peso médio dos estudantes (arredondado às décimas)?
 (A) 61,8 kg (B) 63,1 kg (C) 60,4 kg (D) 62,9 kg
11. Uma turma do 12º ano tem 20 alunos, dos quais 9 são rapazes e 11 raparigas. Sabe-se que somente 5 alunos nasceram no Porto. Destes, 2 são rapazes e 3 são raparigas. Qual a probabilidade de escolhendo um rapaz ao acaso, ele não ter nascido no Porto?

- (A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{2}{20}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{7}{20}$

12. Sejam A e B dois acontecimentos associados a uma experiência aleatória. Sabe-se que:

$$P(B) \neq 0; P(A|B) = 0,4; P(A \cap \bar{B}) = P(A) - 0,1$$

Qual o valor de $P(B)$?

- (A) 0,25 (B) 0,50 (C) 0,40 (D) 0,75
13. Considere a seguinte tabela de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X:

$X = x_i$	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	a	2a	b	a	b

Sabendo que a e b são números reais e que $P(X = 0) = 2 \times P(X = 2)$, qual o valor de $P(X = 1)$?

- (A) 0,8 (B) 0,4 (C) 0,6 (D) 0,2
14. Sejam A, B e C três acontecimentos não nulos de um espaço de resultados Ω . Sabendo que $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,7$; $P(A|C) = 0,5$ e $P(B|C) = 0,6$,

assinale a opção correta:

- (A) B e C são acontecimentos independentes. (B) A e B são acontecimentos incompatíveis (isto é $A \cap B = \emptyset$).
 (C) $P(A|C) = P(\bar{A}|C)$ (D) A e C são acontecimentos independentes.